



Prof. Dr. med. Dr. med. dent.

VOLKER GASSLING

Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie
Plastische Operationen | Ästhetische Gesichtschirurgie

FACELIFT

Vorbereitung

Absetzen von gerinnungshemmenden Medikamenten (z.B. Aspirin) ca. 1 Woche vor der Operation. Untersuchung der Blutgerinnung durch den Hausarzt. Verzicht auf Alkohol und Zigaretten ca. 2 Woche vor und nach der Operation.

Operation

Der Eingriff wird üblicherweise in Vollnarkose durchgeführt. Die Schnittführung verläuft vor und hinter dem Ohr bis in den Haaransatz. Danach wird die Haut abgelöst und das SMAS (Superficial musculo-aponeurotic system) gestrafft. Die Wunden werden mit Nähten verschlossen.

Postoperativer Verlauf

Die Nahtentfernung erfolgt nach ca. 7-10 Tagen. Die Abheilungsphase dauert ca. 3 Wochen. Auf Sport sollte für 4-6 Wochen verzichtet werden.

Komplikationen

Üblicherweise kommt es nach der Operation zu Blutergüssen, Gefühlsstörungen und Schwellungen. Gelegentlich kann eine Speichelansammlung unter der Haut eine Punktion notwendig machen. Im Fall von Nachblutungen müssen diese operativ entlastet werden. In seltenen Fällen kann es hierbei auch zu einer Verletzung des motorischen Gesichtsnervs kommen.

Weitere Informationen:

Gaßling V, Troeltzsch M, Troeltzsch M. Ästhetische Medizin des Gesichts - Ein Überblick über Grundlagen sowie nicht operative und operative Möglichkeiten. Teil 3: Operative Techniken zur Verjüngung des Mittelgesichtsbereiches. Die Quintessence 2014; 65(8): 983-988.

Troeltzsch M, **Gaßling V**, Probst F, Mayer P, Pache C, Gruber R, Otto S, Troeltzsch M. Ästhetische Medizin des Gesichts - Ein Überblick über Grundlagen sowie nicht operative und operative Möglichkeiten. Teil 1: Klinisch relevante Grundlagen, Anatomie und Physiologie des Alterungsprozesses im Gesicht. Die Quintessence 2014; 65(6): 733-739.

Gassling V, Koos B, Birkenfeld F, Wiltfang J, Zimmermann CE. Secondary cleft nose rhinoplasty: Subjective and objective outcome evaluation. J Craniomaxillofac Surg. 2015 Nov;43(9):1855-62.

Gierloff M, Stöhring C, Buder T, **Gassling V**, Açil Y, Wiltfang J. Aging changes of the midfacial fat compartments: a computed tomographic study. Plast Reconstr Surg. 2012 Jan;129(1):263-73.